

Código: PBAAR

Material: escarro

Sinônimo: Bacilos álcool-ácido resistentes, Baciloscopia

Volume: Volume colhido

Método: Microscopia (Coloração de Ziehl Neelsen)

Volume Lab.: Volume coletado

Rotina: Diária

Temperatura: Refrigerado

Coleta: Urina - Realizar higiene genitais, desprezar o primeiro jato e colher todo volume da primeira urina da manhã em frasco estéril, enviar uma alíquota no frasco estéril de 50 mL.

Escarro - A coleta de escarro deve ser realizada preferencialmente de manhã ao se levantar, antes da higiene oral e do desjejum. Lavar várias vezes a boca com água pura, gargarejando e bochechando abundantemente. Fazer várias inspirações profundas e tossir várias vezes procurando obter o material da árvore brônquica. Uma boa amostra de escarro é obtida após esforço de tosse, e não a que se obtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais, nem tampouco a que contém somente saliva. O aspecto ideal da amostra é mucopurulento. Enviar o material em frasco estéril volume mínimo 2,0 mL.

Líquidos Nobres - Enviar de 5,0 a 10,0 mL, preferencialmente em tubo Falcon para evitar derramamento durante o transporte.

Pode ser realizado na linfa, devendo dessa forma ser coletada do lóbulo da orelha ou prega do cotovelo e ser enviada as lâminas.

Critério de rejeição da amostra:

Urina - Rejeitar volumes menores de 10 mL.

Escarro - Pouca amostra e saliva.

Linfa - Lâminas com sangue e linfonodos.

Código SUS: 0202080064

Código CBHPM: 4.03.10.05-1

Interpretação:

Uso: diagnóstico de processos infecciosos causados por micobactérias.

As infecções causadas por micobactérias têm aumentado sua incidência devido ao aumento no número de casos de imunodeficiência e ao desenvolvimento de resistência aos quimioterápicos observado na atualidade. Processos patológicos causados por estes microorganismos são de difícil diagnóstico, devido à característica crônica e inespecífica do processo e à dificuldade de isolamento do germe nos locais afetados. A opção de pesquisa de micobactérias por PCR melhorou a capacidade do laboratório em responder com boa sensibilidade e maior rapidez à necessidade diagnóstica. Os materiais empregados podem ser variados, desde escarro, sangue, urina, biópsia, etc.

Referência:

Negativa

Positivo : presença de B.A.A.R