



CA 72-4

Material: soro

Sinônimo: câncer gástrico, mama, pulmões e ovários

Volume: 2,0 mL

Método: Eletroquimioluminescência (ECLIA)

Volume Lab.: 2,0 mL

Rotina: Diária

Temperatura: Refrigerado

Coleta: Jejum não obrigatório. Coletar soro.

Código SUS:

Código CBHPM: 4.03.16.37-8

Interpretação:

Uso: marcador sérico para câncer gástrico, mama, pulmões e ovários.

CA 72-4 ou TAG72 é encontrado em concentrações elevadas nos pacientes com carcinoma gástrico ou câncer de ovário tipo mucinoso.

Principal uso ; monitorar o tratamento e prever o retorno de malignidade gastrointestinal. Para o câncer gástrico, este marcador é mais sensível que o CEA ou CA 19-9 e tem uma especificidade maior para diferenciar circunstâncias malignas de benignas.

Usado conjuntamente com CA 125 no carcinoma ovariano mucinoso. Níveis elevados podem ser encontrados nos pacientes com carcinoma colo retal e do pâncreas , mama e pulmão. Níveis elevados são raramente encontrados em processos benignos e inflamatórios. Combinado com o CA 19-9 e ou CA 125 , aumenta muito a sensibilidade do teste .

Referência:

Inferior a 8,2 U/mL